

Elérhetőségeink

Gyarmati Bálint

Értékesítési vezető
30-474-9284
balint.gyarmati@limagrain.com

Perczel Péter

Ügyviteli vezető
30-993-65-42
peter.perczel@limagrain.com

Bódis Zoltán

Kiemelt ügyfélkapcsolati vezető –
Alföld
30-683-2991
zoltan.bodis@limagrain.com

Észak-Zala és

Vas megye Katona Zsuzsa

30-247-5955
zsuzsa.katona@limagrain.com

Dél-Zala és

Nyugat-Somogy megye Nemes Krisztián

30-454-9924
krisztian.nemes@limagrain.com

Kelet-Somogy megye

Szabó Balázs

30-407-4881
balazs.szabo@limagrain.com

Győr-Moson-Sopron megye

Ofenbeck János

30-681-7798
janos.ofenbeck@limagrain.com

Tolna megye

Dobos László

30-847-8008
laszlo.dobos@limagrain.com

Fejér megye

Kojnok Ádám

30-545-5100
adam.kojnok@limagrain.com

Baranya megye

Mészégető György

30-396-0416
gyorgy.meszegeto@limagrain.com

Veszprém megye

Vida Ákos

70-516-5592
akos.vida@limagrain.com

Komárom-Esztergom megye

Erdélyi Dénes

30-260-4490
denes.erdelyi@limagrain.com

Hajdú-Bihar megye

Dr. Tóth Pál

30-276-3322
pal.toth@limagrain.com

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Poczkodi József

30-913-8308
jozsef.poczkodi@limagrain.com

Szabolcs-Szatmár-

Bereg megye

Eszterhai Zoltán

30-746-9791
zoltan.eszterhai@limagrain.com

Bács-Kiskun megye

Görcs Ferenc

30-768 4574
ferenc.gorcs@limagrain.com

Csongrád megye

Józsa Ignác

30-527-7499
ignac.jozsa@limagrain.com

Békés megye

Tolnai György

30-237-7640
gyorgy.tolnai@limagrain.com

Jász-Nagykun-Szolnok

Hoppál Attila

30-566-3170
attila.hoppal@limagrain.com

Heves megye

Bódis Zoltán

30-683-2991
zoltan.bodis@limagrain.com

Nógrád és Pest megye

Kaszás János

30-486-6719
janos.kaszas@limagrain.com



Magról magra magasabbra

KÖZPONTI IRODA – Budaörs Gyár u. 2, 2040, Tel.: 23-421-005 és 23-418-104
Fax: 23-418-105, e-mail: limagrain-budaors@limagrain.com
www.lgseeds.hu

LG VETŐMAGOK 2014



Megújult
kukorica
genetikánk
– A tudomány
ígéretes alkotásai



Gyommentes életre
terem – A CL
technológia éllovas
napraforgói



A siker forrása az ember
– LG az Ön szolgálatában!



www.lgseeds.hu

Amire még
a gazda
szeme is
felcsillan!

Tisztelt Gazdálkodó, Kedves Olvasó!

Az LG a változatos vetőmag kínálatával, az európai mezőgazdaság sokszínűségét testesíti meg. Olyan új hibrideket és fajtákat nemesítünk, melyek megfelelnek a modern technológiai és gazdasági követelményeknek, valamint a gazdálkodók és az ipari felhasználók specifikus igényeinek.

A szerteágazó kukorica nemesítés során a molekuláris biológia legújabb felfedezéseinek alkalmazásával széleskörű genetikai bázist teszünk. Ez a genetikai változatosság és a világszerte végzett laboratóriumi és szántóföldi vizsgálatok biztosítják élő és élettelen környezeti stressz tényezők befolyásának jobb megismerését, az alkalmazkodás lehetőségét.

A Limagrain kutatói jelentős erőfeszítéseket tesznek a klímaváltozás hatásaként a Föld egyre nagyobb területein, köztük a Kárpát-medencében is, mind gyakrabban bekövetkező szárazságra adható válaszlépések kidolgozásán, így a termőképesség növelése mellett, a termésbiztonság további fokozására helyezve egyre nagyobb hangsúlyt.

A napraforgó nemesítési célkitűzések között a kiváló termőképesség, termésbiztonság mellett kiemelkedő feladat betegségekkel szembeni ellenállóság és nem utolsósorban a terjedő újabb napraforgó szádorasszokkal szembeni rezisztencia is. A magyar piacra azok a hibridek kerültek és kerülnek bevezetésre, amelyekben mindez a legmagasabb szinten ötvöződik.

A Limagrain munkatársai minden egyes nap arra törekednek, hogy bővítsék a lehetőségek tárházát, hiszen csak így lehet folyamatosan új és kiegyensúlyozott válaszokat találni a felmerülő kérdésekre.

A folyamatos innovációval az LG a mezőgazdaság és élelmiszeripar gazdasági fejlődését segíti, de mindig szem előtt tartja a környezettudatos magatartás fontosságát. Ezen tapasztalatok alapján termékkatalógusunk olyan megoldásokat kínál, amelyek lehetővé teszik a hatékonyabb növény-termesztést.

Gyarmati Bálint
értékesítési vezető

LG 30.369 Limanova




A tudomány
ígéretes
alkotása!

Kiemelt
termékünk!

A korábbi LG hibridekhez képest más genotípusú, igazi novum a kínálatunkban. 2012-ben tűnt fel a fejlesztési kísérletekben. Mind a kedvező, mind a stresszes termőhelyeken szisztematikusan a koraiak átlagánál lényegesen nagyobb termést produkált. 2013-ban, megismételve előző évi teljesítményét, kiváló termésstabilitását is bizonyította.

Limagrain magyarországi fejlesztési kísérletek, 2013.




Középmagas szárú hibrid. Közepes méretű, hengeres csövei még stressz helyzetben is kiegyenlítettek, jól termékenyülnek. Jellemző szemsorszáma: 16-18. Gyökér-, és szárdőlésre nem hajlamos. Csőegészsége nagyon jó.

Tőszámjavaslat:

jobb termőhelyeken	70-75 ezer tő/ha
gyengébb termőhelyeken	65-70 ezer tő/ha

Limagrain Közép-európai fejlesztési kísérletek eredményei alapján, 2012.




Termőképessége, tenyészideje és alkalmazkodó képessége lehetővé teszi, hogy bármely gazdaságban gerincét képezze a kukorica vetésszerkezetnek. Kezdeti fejlődése és hidegtűrése jó, alacsony talajhőmérsékletnél is biztonságosan vethető. Vízleadása gyors, betakarításkori szemnedvessége az azonos érésű hibridekéhez képest alacsonyabb.



LG 30.430




A húsz
szemsoros
csoda!




Termőképessége a középérésű hibridektől elvárható magas szintű. **Mellé dinamikus vízleadás társul.** E két tulajdonság együttesen emeli ki versenytársai közül.

Az LG 30.430 vízleadás dinamikája fejlesztési kísérletben (2012., Debrecen)



Új típusú hibrid a középérésű csoport elején. Középmagas növésű, csőkötése közepesen magas. Fokozatosan lehajló, **zömök csövein nem ritkán 20 szemsor található.** Alkalmazkodóképessége nagyon jó, szárazságban is kiegyenlített, stabilan teljesít.

Limagrain kisparcellás fejlesztési kísérletek, 2011.



Gyökere és szára erős. A cső egészsége kiváló, gombafertőzéseknek jól ellenáll.

Tőszámjavaslat:

jobb termőhelyeken 68–72 ezer tő/ha,
gyengébb termőhelyeken 65–68 ezer tő/ha.

LG 30.440




Új generációnk
ékköve!

Kiváló termőképességű, a termésstabilitást és a gazdaságosságot ötvöző új hibrid.

Különösen intenzív körülmények között jelentős a terméstopplete, de szerényebb feltételek esetén is átlag feletti eredményeket produkált.

Termékfejlesztési kísérleteinkben az **éreszcsoport meghatározó hibridjeit nettó hozamával rendre maga mögé utasította.** **Vízleadása gyors.**

Limagrain kisparcellás fejlesztési kísérletek, 2011.



Kezdeti fejlődése jó.


Gyökere és szára erős, dőlésre nem hajlamos, fuzáriumos szárkorhadásra nem fogékony. Alkalmazkodóképessége jó, az ország minden kukorica-termő régiójában termesztendő, de kizárólag fővetésben javasoljuk.

Tőszámjavaslat:

jobb termőhelyeken 68–72 ezer tő/ha,
gyengébb termőhelyeken 65–68 ezer tő/ha.

Magas növésű hibrid, közép-magas csőkötéssel. Az érés folyamán fokozatosan lehajló, szabályos, vastag csövein 18 szemsor található.

Limagrain bemutató fajtakísérletek, 2013.



A cső egészséges, gombafertőzéseknek jól ellenáll. Ezért takarmányozási célra biztonságosan felhasználható.



LG 30.325




Új típusú lófogú hibrid a korai éréscsoport elején. Magyarországon a regisztrációs kísérletek két évének átlagában, a két korai szten-
 derd szintjén termett.

Vízleadása gyors. Fejlesztési kísérleteinkben a legalacsonyabb nedvességtartalommal betakarított hibrid volt a korai éréscsoportban.


Gyors vízleadásával azoknak jelent kitűnő megoldást, akik a korai betakarítás előnyeit kihasználva nem akarnak lemondani a nagy terméshozamról sem.

Az LG 30.325 vízleadása fejlesztési kísérletben. (Debrecen 2013.)



Kezdeti fejlődése jó.
 Jellemző szemsorszáma: 16–18.
 A viszonylag kicsi méretű szemek, jól kitöltik a kompakt csöveken rendelkezésükre álló helyet.

MgSzH kisparcellás fajtaösszehasonlító kísérletek, 2010-2011. (Korai érésű csoport)



Mivel korán beérik, érdemes azonnal betakarítani, hogy utána kellő időben, jó magágyat készíthessünk az őszi búza számára. Alkalmazkodóképessége és termésstabilitása jó. Általános betegség-ellenállósága jó, cső-fuzáriumra nem fogékony.

Tőszámjavaslat:
 jobb termőhelyeken 68–72 ezer tő/ha
 gyengébb termőhelyeken 65–68 ezer tő/ha
 Az indokolatlanul magas tőszám alkalmazását kerüljük.

LG 30.360



A jó termőképesség és a kiváló termésstabilitás összhangját biztosító hibrid.

Különösen a gyengébb adottságú termőhelyeken mutatkozik meg jó alkalmazkodóképessége. Vízleadása gyors, betakarításkori szemnedvessége az éréscsoport közepére jellemző. Magas szárú hibrid, közepesen magas csőkötéssel. Stresszhelyzetben is jól termékenyül. Jellemző szemsorszáma: 16–18. Szára erős; fuzáriumos szárkorhadásra nem fogékony. Gyökér-, és szárdőlésre nem hajlamos. Cső-fuzáriummal szemben nagyon jó toleranciával rendelkezik.

Tőszámjavaslat:
 jobb termőhelyeken
 gyengébb termőhelyeken

70–75 ezer tő/ha,
 65–70 ezer tő/ha.

LG 33.30

*Biztos hozam
 évek óta!*

Hosszú, kúpos-hengeres alakú, csöveinek jellemző szemsorszáma 14–16. **Termékenyülése kedvezőtlen feltételek esetén is nagyon jó.**

Vízleadása gyors, ezért korán betakarítható. Jó évjáratokban az őszi kalászosok optimális időben vethetők utána.

Kezdeti fejlődése gyors, megkésztet vetésnél május közepéig vethető.

Tőszámjavaslat:
 jobb termőhelyeken 75–82 ezer tő/ha,
 gyengébb termőhelyeken 65–75 ezer tő/ha.



Hasznosítás: szemes
Éréscsoport: korai
FAO 340
Minősítés éve: 2005

LG 33.50 *A népszerű!*

Kézzelfogható előnyöket nyújt a legkeresettebb éréscsoportban. Kiváló termésstabilitású, a korai éréscsoport közepén érő hibrid.

Jó kezekben és jó termőhelyi adottságok esetén kiemelkedő termésre képes. Vízeledása jó, betakarításkori szemnedvessége az éréscsoport átlagára jellemző. Jó alkalmazkodóképességének és stressztűrésének köszönhetően, egyre népszerűbb. Szára szilárd, fuzáriumos szárkorhadással szemben ellenálló. Általános betegség-ellenállósága jó, fuzáriumos csőpenészre nem fogékony. Zöld száron érő hibrid.

Csutkaja fehér. Jellemző szemsorszáma 16. Korán vethető, jól tűri a keléskori hideget. Kezdeti fejlődése egyenletes és gyors.



Tőszámjavaslat:

jobb termőhelyeken 70–75 ezer tő/ha,
 gyengébb termőhelyeken 63–70 ezer tő/ha.

Hasznosítás: szemes
Éréscsoport: korai
FAO 340
Minősítés éve: 2005


A korai éréscsoport végén érő, **kiváló termőképességű hibrid. Bőségesen megtérül, ha kiszolgálják az igényeit, ezért az intenzív termesztést folytató gazdálkodóknak jó termőhelyi adottságok közé ajánljuk.**

Magas, zöld száron érő hibrid. Szemei nagyon jól telítődnek, hektoliter tömege nagy. Vízeledása az éréscsoportjának megfelelően gyors. Gyökér- és szárdőlésre nem hajlamos. Általános betegség-ellenállósága jó, szárszilárdsága kiváló. Vékony, piros csutkáján a jellemző szemsorszám 14–16.

Hidegtűrése és kezdeti fejlődési erélye jó, már alacsony talajhőmérsékletnél is vethető.

LG 33.95 *A legendás!*

Limagrain magyarországi fejlesztési kísérletek, 2013.



Tőszámjavaslat:

jobb termőhelyeken 70–75 ezer tő/ha,
 gyengébb termőhelyeken 63–70 ezer tő/ha.

LG 30.491

Kiemelkedő termőképesség és profitabilitás jellemzi. Fejlesztési kísérleteinkben 2010-ben és 2011-ben a hasonló tenyésztője **versenytárs hibrideket jelentősen felülmúló terméseredményeket ért el.** Kiváló termőképessége különösen az intenzív termesztés technológiát alkalmazó gazdaságokban, jó termőhelyi feltételek között fejeződik ki. Magas növésű, közepesen magas csökötéssel.

Jellemző szemsorszáma 16. Alkalmazkodóképessége jó. Szárszilárdsága nagyon jó, gyökér- és szárdőlésre nem hajlamos. Szár- és csőfuzáriumra valamint üszögre nem fogékony. Ezért takarmányozási célra — akár nedvesen roppantva,



akár szárítva — biztonságosan felhasználható. Vízeledása az éréscsoportjára jellemző.

Tőszámjavaslat:

jobb termőhelyeken 65–72 ezer tő/ha,
 gyengébb termőhelyeken 57–65 ezer tő/ha.

LG 35.35

Termesztését elsősorban az ország déli megyéiben javasoljuk, ahol a megfelelő hőösszeg biztosított a késői hibridek beéréséhez.

Kiváló termőképességű, az éréscsoportjára jellemző termésszintű hibrid. Jó alkalmazkodóképességének és szárszilárdságának köszönhetően termésstabilitása nagyon jó, szárazabb évjáratokban és termőhelyeken is megbízhatóan terem.

Betakarításkori szemnedvessége, az éréscsoport átlaga alatti. Nagy, vastag csővei kiegyenlítették, jól termékenyülnek. Fehér csutkáján a szemsorszám 16. A cső egészséges, gombafertőzéseknek jól ellenáll. Ezért takarmányozási célra — akár nedvesen roppantva, akár szárítva — biztonságosan felhasználható.



Tőszámjavaslat:

jobb termőhelyeken 65–72 ezer tő/ha,
 gyengébb termőhelyeken 57–65 ezer tő/ha.

Egyedi silóprogramunk

Tej-, és profittakasztó hibridek

Franciaországtól Lengyelorszáig és Hollandiától Csehorszáig végzünk élő állat vizsgálatot kiváló eredménnyel. A hazánkban már két éve tartó kísérleti eredmények is kiválóak hiszen a kísérletekben egy kontroll csoport és az LGAN hibridet fogyasztó csoportok esetében az LGAN szilázst fogyasztó csoport 2011-ben **+ 0,6 kg tej/nap/tehén** míg 2012-ben **+1,09kg tej/nap/tehén tejtöbbletet** adtak úgy, hogy **nőtt a tejszír és tejfehérje mennyisége is.**

Ennek a programnak az egyik legfontosabb hozadéka, hogy **a kukoricában sikerült a lignin, mint rostalkotó és egyes rostfrakciók közötti kötéseket gyengíteni így lehetővé téve a magasabb, jobb rost emészthetőséget.** Ezáltal a napi takarmányadag adott kukorica szilázs részéből, mint a legfontosabb tömegtakarmányból a tejelő szarvasmarhák nagyobb mennyiségű energiát képesek nyerni, növelve ezzel a napi és laktációs tejtermelést (vizsgálataink szerint magasabb tejszír, tejfehérje szint

mellett alacsonyabb tejkarbamid tartalommal). Az ilyen tulajdonságokkal is rendelkező hibridek kapják meg az LGAN minősítést és logót. Az ilyen speciális tulajdonságokkal ellátott silókukoricánkat egyedi jelöléssel tesszük még felismerhetőbbé:



Összefoglalva, a termelők előnye az LGAN hibridkukoricák használatával:

- a hektáronkénti többletenergia
- a magasabb napi rost- és szárazanyag bevitel
- egészségesebb állatállomány
- többlet tejhozam
- eredményesebb tejtermelés
- a hibridválasztás biztonsága

LGAN silókonferenciánk 2013



LG 34.90



A tejfakasztó!

Magas, zöld száron érő, felszáradásra nem hajlamos.

Általános betegség-ellenállósága jó, fuzárium fertőzésekkel szemben ellenálló.


Tenyészideje alapján az ország legnagyobb silókukorica termesztő megyéiben eredményesen és sikerrel termesztendő.

Kiváló beltartalmi mutatókkal rendelkező, a minőségi takarmányozás alapjait megteremtő, kitűnő zöldtermésű silókukorica.


A teljes növény emészthetősége kiváló, így nagy energia tartalmú, kiválóan hasznosuló szilázs készítését teszi lehetővé.

Ezen értékmérő alapján kapta meg az „LGAN” megkülönböztető jelzést.

Az LG 34.90 hibridből készült szilázst fogyasztó tehéncsoport többlet tejtermelése



Kukoricaszilázs NDF lebonthatóság, Herceghalom 2012



Azonos laktációs stádiumban lévő 2 tehéncsoport összehasonlításakor, 2 hónap kísérleti periódus alatt, a jobb rost emészthetőségű **LG 34.90 hibridből készült szilázst tartalmazó TMR-t** fogyasztó állatok a kontroll csoportnál 2011-ben 0,6 , míg 2012-ben 1,09 kilogrammal több tejet termeltek naponta. (Dr. Orosz Sz. és munkatársai Mezőhegyesen 2011-2013 időszakban végzett kísérlete alapján.)

Tőszámjavaslat:

jobb termőhelyeken 75–80 ezer tő/ha,
gyengébb termőhelyeken 70–75 ezer tő/ha.



SHANNON



Kiváló minőséget biztosító silókukoricáink csoportjának új tagja.

Azok figyelmébe ajánljuk, akik nem akarnak kompromisszumot kötni; kiemelkedő hozamot terveznek, jó minőséggel a nagyobb tejhozamok érdekében.

Magas növésű hibrid, kiemelkedő zöld-, és szárazanyagtermés jellemzi. Kiválóan emészthető, energia-dús szilázs készítését teszi lehetővé. Zöld száron érő hibrid, a szár felszáradása lassú. Általános betegség-ellenállósága jó, fuzáriumos fertőzésekkel szemben jól ellenálló. Gyors kezdeti fejlődésű.



Tőszámjavaslat:

jobb termőhelyeken 68–78 ezer tő/ha,
 gyengébb termőhelyeken 65–68 ezer tő/ha.

Hasznosítás: silókukorica
Éréscsoport: késői érésű
FAO 570

JANETT



Zöldtermése és energiatartalma kiváló. Dús levélzete valamint rostjainak emészthetősége a teljes növény emészthetőségét kedvezően befolyásolja.

A késői éréscsoport második felében érő, közepesen magas növésű silókukorica. Szárszilárdsága kiváló.

Termesztését elsősorban az ország déli régióiban javasoljuk, ahol a késői hibridek termesztéséhez szükséges hőösszeg rendelkezésre áll.

Tőszámjavaslat:

jobb termőhelyeken 68–75 ezer tő/ha,
 gyengébb termőhelyeken 65–68 ezer tő/ha.



Kiváló emészthetősége és jól hasznosuló energiatartalma alapján a speciális „LGAN” minőség követelményeinek teljes mértékben megfelelő hibrid.

Acienda

Kettős hasznosításra alkalmas, kitűnő szem-, és zöldtermést adó hibrid. Az elmúlt években számos kísérletben és üzemi táblán bizonyította kiváló tulajdonságait.

Beltartalmi mutatói nagyon jók, ezért silókukoricaként termelve energiában gazdag, tömegtakarmány előállítására alkalmas.

Magas, nagy vegetatív tömeget növel. Zöld száron érő hibrid, felszáradása lassú.

Szemesként termesztve, nagy termőképessége mellett jó csőegészsége, szilárd szára a gazdaságosság biztosítója. Csövei nagy szeműek, a csutka vékony, piros színű.



Alkalmazkodó képessége jó, a keléskori hideget jól tűri, korán vethető.

Tőszámjavaslat:

jobb termőhelyeken 68–75 ezer tő/ha,
 gyengébb termőhelyeken 63–68 ezer tő/ha.

LG 30.310



Magjának minősége kiváló, grízkihozatala alapján élelmiszeripari célra is felhasználható.

Vízleadása átlagos, az éréscsoportjára jellemző.

Általános betegség-ellenállósága jó, szár- és csőfuzáriumra nem fogékony, golyvásüszöggel szemben toleráns.

Vetését az éréscsoportra és a termőhelyre jellemző optimális időszakban ajánljuk.

Tőszámjavaslat:

jobb termőhelyeken 75–80 ezer tő/ha,
 gyengébb termőhelyeken 65–75 ezer tő/ha.

Hasznosítás: malomipari
Éréscsoport: korai
FAO 350

Gyom- és stresszmentes napraforgó állomány: a Clearfield® gyomirtási rendszer pillérei

A Clearfield® gyomirtási technológia egyik eleme a gyomirtószeres kezelés, amely két lépésből áll. Az első a közvetlenül vetés után, kelés előtt kijuttatott, tartós talajon keresztüli hatást biztosító

3,5 l/ha Wing®-P. A második a kikelt gyomok kettő-négy leveles állapotában, állományban kipermetezett 1,2 l/ha PULSAR® 40 SL. A PULSAR® 40 SL a Clearfield® napraforgó hibridekre nézve szelektív, a napraforgónak valódi posztemergens gyomirtó szere.




A technológia másik pillérét az imidazolinon ellenálló, más néven Clearfield® napraforgó hibrid jelenti.

A Clearfield® hibridek rendelkeznek azokkal a génekkel, amelyek lehetővé teszik a napraforgó számára az imazamox hatóanyag lebontását. A Limagrain CL napraforgó hibridjeiben hatékonyabban működnek a lebontást végző enzimek, így más hibridekkel ellentétben fitotoxicitási tünetek, mint például levélsárgulás, deformációk – a gyomirtószer előírás szerinti alkalmazása esetén – nem, vagy lényegesen kisebb mértékben jelentkeznek.

A tenyésztő folyamán gyakran komplexen jelentkező stressz hatásokra érdemes olyan hibridek választásával felkészülni, amelyek ellenálló képessége a megfelelően illeszkedő technológiával együttesen biztosítja a maximális termést.

Technológiai ajánlatunk a napraforgó gyomirtására a Clearfield® gyomirtási rendszer alkalmazásával



LG 56.33 CL


Gyommentes életre terem!

Nagy termőképessége mellett a korai érés, gyors és gazdaságos betakaríthatóság a fő erénye.

Magas technológiai színvonalú termesztésnél, jó évjáratban kiugró termésre képes. Nagy olajtermését a kiváló kaszattermése és 45-46% körüli olajtartalma eredményezi. Eltérő termőhelyi adottságoknál is eredményesen és biztonságosan termeszthető.




Limagrain kisparcellás fejlesztési kísérletek, 2012.



Középmagas, erős szárú hibrid. Nagy tányérátmérő, félig bókóló tányérállás, még a kedvezőtlen feltételek esetén is jó termékenyülés jellemzi. Kaszatja enyhén csikolt. Ezerkaszattömege kimagasló.

Limagrain bemutatató fajtakísérletek, 2013.




Peronoszpóra és szádorrezisztens, így – az imazamox kezeléssel együtt – kettős védelemmel rendelkezik a száddal szemben. Általános betegség-ellenállósága nagyon jó. Diaportéval és fómával szembeni ellenállósága kifejezetten jó, szártő- és tányér-szklerotiniával szemben jó toleranciával rendelkezik.

Javasolt tőszáma: 55–57 ezer tő/ha.

LG 56.58 CL

A technológia éllorasa!


A hibriden az elmúlt évben (2013) a felülkezelések után fitotoxicitási tünetek egyáltalán nem jelentkeztek.



Kiegyensúlyozott teljesítményét a köztermesztésben már évek óta bizonyítja.

Alkalmazkodóképessége az eltérő termőhelyekhez és technológiákhoz nagyon jó. Olajtartalma magas: 48–50%.

Napraforgó hibridek fehérpenészes szártörőthadás (Sclerotinia sclerotiorum) fertőzöttsége a NÉBIH kísérleteiben, 2012




Kiváló termőképességű, imidazolinon-ellenálló napraforgó hibrid.

A hibrid a speciális gyomirtási technológia alkalmazásával növeli a termelés biztonságát, emeli az üzemi átlagot!

Szádortoleráns, így az alkalmazott gyomirtási technológiával kiegészülve terjedő szádorfertőzéssel szemben kettős védelemmel rendelkezik.

Kisparcellás fajtaösszehasonlító kísérletek eredményei, NÉBIH 2012.



Peronoszpóra rezisztens.

Különösen ellenálló diaporte, fóma és tányér-szklerotiniával szemben.

Szár-szklerotinia és makrofomina toleranciája nagyon jó.

Vetése során törekedjünk az egyenletes, homogén növényállomány kialakítására.

Javasolt tőszáma: 55–57 ezer tő/ha.

Kiemelt termékünk!

LG 56.55


Hagyományosan a legjobb!

A Limagrain legnagyobb területen vetett hagyományos technológiával termesztendő napraforgó hibridje Magyarországon. Kiemelkedő termőképességű és termésbiztonságú napraforgó.

Kiváló tulajdonságait különböző évjáratokban és agrotechnikai színvonalon, valamint eltérő adott-ságú termőhelyeken üzemi körülmények között is folyamatosan bizonyítja.



Kisparcellás fajtaösszehasonlító kísérletek eredményei alapján, MgSzH 2007–2012.




Olajtartalma 47–48 %.

Nagy kaszattermése és a jó olajtartalma kiváló olajtermést eredményez.

Alkalmazkodóképessége nagyon jó, szárazságtűrése jó.

Napraforgó hibridek fehérpenészes szártörőthadás (Sclerotinia sclerotiorum) fertőzöttsége a NÉBIH kísérleteiben, 2012



Peronoszpóra rezisztens (PR).

A leggyakrabban előforduló szár- és tányérbetegségekkel szemben jó ellenállósággal rendelkezik. Középmagas, zöld száron érő hibrid.

Magyarország bármely napraforgó termőhelyén eredményesen és kockázatmentesen termesztendő.

Ajánlott tőszáma: 55–57 ezer növény/ha.



Kukorica

összefoglaló táblázat

Hibrid	FAO szám	Hasznosítás / Speciális tulajdonság	Termő-képesség	Vizleadás	Cső-egészség	Alkalmazkodó-képesség	Termőhelyi és tőszám javaslat (ezer tő)		
							gyenge	átlagos	jó
LG 32.58	260	szemes és siló	jó	átlagos	kiváló	jó	65	75	80
LG 23.06	320	szemes	jó	gyors	nagyon jó	kiváló	65	75	80
LG 30.325	330	szemes	jó	nagyon gyors	nagyon jó	nagyon jó	65	68	72
LG 33.30	340	szemes	jó	gyors	nagyon jó	kiváló	65	75	82
LG 30.310	350	HSG malomipari	jó	átlagos	kiváló	jó	65	75	80
LG 33.50	350	szemes	nagyon jó	átlagos	kiváló	nagyon jó	63	70	75
LG 30.360	360	szemes	jó	átlagos	nagyon jó	kiváló	65	70	75
LG 30.369 ÚJ	370	szemes	kiváló	nagyon gyors	kiváló	kiváló	65	70	75
LG 33.95	390	szemes	kiváló	átlagos	nagyon jó	jó	60	68	75
LG30.430 ÚJ	430	szemes	kiváló	nagyon gyors	kiváló	kiváló	65	68	72
LG 30.440 ÚJ	450	szemes	kiváló	nagyon gyors	kiváló	kiváló	65	68	72
LG 34.75	450	szemes	nagyon jó	gyors	nagyon jó	nagyon jó	57	65	72
LG 30.491	460	szemes	nagyon jó	átlagos	nagyon jó	jó	57	65	72
LG 35.35	510	szemes	nagyon jó	átlagos	kiváló	nagyon jó	55	63	70
Acarro	440	siló	kiváló	felszáradása lassú	jó	jó	70	75	80
Acienda	460	siló és szemes	kiváló	szemesként átlagos	nagyon jó	jó	70	75	80
LG 34.90	480	LG Animal Nutrition siló	kiváló	felszáradása lassú	kiváló	kiváló	70	75	80
Shannon ÚJ	520	LG Animal Nutrition siló	kiváló	felszáradása lassú	kiváló	nagyon jó	65	68	75
LG 35.62	560	siló	kiváló	felszáradása lassú	kiváló	kiváló	65	68	75
Janett	570	LG Animal Nutrition siló	kiváló	felszáradása lassú	kiváló	nagyon jó	65	68	75

Napraforgó

összefoglaló táblázat

Hibrid	Tenyész-idő	Speciális tulajdonság	Termő-képesség	Olajtartalom	Szádor rezisztencia	Alkalmazkodó-képesség	Ajánlott tőszám (ezer termő tő/ha)	Megjegyzés
LG 56.33 CL	korai	CLEARFIELD®	kiváló	átlagos	E rassz	kiváló	55-57	csíkos kaszat
LG 56.46 CL	középkorai	CLEARFIELD®	kiváló	jó		kiváló	55-57	
LG 56.58 CL	középérésű	CLEARFIELD®	kiváló	magas	toleráns	nagyon jó	55-57	
LG 56.63 CL	középérésű	CLEARFIELD®	nagyon jó	jó	E rassz	nagyon jó	55-57	csíkos kaszat

LG 53.77	igen korai		nagyon jó	magas		nagyon jó	55-57	
LG 54.85	korai		nagyon jó	magas	E; G rassz	kiváló	55-57	
LG 56.55	középkorai		kiváló	jó		kiváló	55-57	

LG 54.51 HO CL	korai	magas olajsavtartalom, CLEARFIELD®	nagyon jó	átlagos		nagyon jó	55-57	
LG 54.52 HO CL	korai	magas olajsavtartalom, CLEARFIELD®	nagyon jó	jó	E; G rassz	kiváló	55-57	
LG 56.56 HO	korai	magas olajsavtartalom	kiváló	jó		nagyon jó	55-57	

Oldalmutató

- Bevezető..... 2. oldal
- Kukoricák..... 3–13. oldal
- Napraforgók... 14-17. oldal

